AKRINOR®

Der Wirkmechanismus von Cafedrin/Theodrenalin

Akrinor® – ein Inopressor

- Positiv inotrop ¹⁻⁴
- Vasopressor ^{3,4,6}

Die hämodynamische Wirkung antagonisiert beide Effekte der Allgemeinanästhesie, sowohl den Abfall des peripheren Widerstandes als auch den Rückgang des Herzzeitvolumens ^{1-4, 6}

1. Fachinformation Akrinor®, Stand: 8/19
2. Sternitzke N et al. Herz Kreislauf 1984;8:401–412
3. Bein B, et al. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
4. Weitzel M et al. Der Anaesthesist 2018;67:766–772
5. Heller et al., Anaesthesist. 2015 Mar;64(3):190-6
6. Müller H, et al. Regional-Anästhesie 1985;8:43-9
7. Bihler K, et al. Anaesthesist 1972;21:428-436
8. Sakai K, et al. (Drug Res) 1972; 22(4):698-701 (präklinische Daten)
9. Sakai K, et al. Jap J Pharmac 1969;19:194-8 (präklinische Daten)

- Mobilisierung venöser Blutreserven und Vorlaststeigerung ¹⁻⁴
- Milde Gefäßtonisierung, Reversierung anästhesiebedingter Vasodilatation ^{4,6*}
- Günstig für die Nierenfunktion ⁷⁻⁹
- Im Wesentlichen Zunahme der Inotropie ¹⁻⁴
- Schlag- und Herzzeitvolumen werden gesteigert ¹⁻⁴
- Vorlaststeigerung ¹⁻⁴
- Herzfrequenz weitgehend unverändert ^{4,5}

* Daten an gesunden Probanden zeigen, dass der periphere Widerstand praktisch unverändert ist. Unter realen Bedingungen der Vasodilatation und Sympathikolyse wurde eine Reversion anästhesiebedingter Vasodilatation gezeigt

Wirkung auf die Koronardurchblutung

- Hinweis auf gute kardiale O₂-Bilanz^{5,6}

1. Fachinformation Akrinor®, Stand: 8/19
2. Sternitzke N et al. Herz Kreislauf 1984;8:401-412
3. Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
4. Weitzel M et al. Der Anaesthesist 2018;67:766-772
5. Hahn N, et al. Herz Kreislauf 1985;9:462-64. (präklinische Daten)
6. Schlepper M und Witzleb E. 1962; 12:841-843.(präklinische Daten)

Synergistische Wirkung in zweierlei Hinsicht:

1. Wirkeintritt und Wirkdauer¹⁻³

1. Fachinformation Akrinor®, Stand: 8/19
2. Bein B, et al. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
3. Sternitzke N et al. Herz Kreislauf 1984;8:401-412

Synergistische Wirkung in zweierlei Hinsicht:

2. Pharmakodynamik¹⁻⁵

Der Blutdruckanstieg basiert auf einer funktionellen Interaktionen der Wirkstoffe

1. Fachinformation Akrinor®, Stand: 8/19
2. Kloth et al., Front Pharmacol. 2017 May 23;8:272
3. Weitzel M et al. Der Anaesthesist 2018;67:766–772
4. Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
5. Sternitzke N et al. Herz Kreislauf 1984;8:401–412
6. Heller et al., Anaesthesist. 2015 Mar;64(3):190-6
7. Sakai K, et al. Jap J Pharmac 1969;19:194-8 (präklinische Daten)

Theodrin

- Zunahme
- Herzkontraktilität¹⁻⁵
 - Schlagvolumen¹⁻⁵
 - Herzzeitvolumen¹⁻⁵
 - Peripherer Gefäßwiderstand¹⁻⁵

Cafedrin

- Dem Theodrenalin gleichgerichtete Wirkung, ohne den peripheren Widerstand zu erhöhen^{1,4,5}
- Reduziert die α1-adrenerge Vasokonstriktion von Theodrenalin^{2,4,7}

- Im Wesentlichen positiv inotrope Wirkung, die zu einer Zunahme von Schlag- und Herzzeitvolumen führt¹⁻⁵. Mobilisierung venöser Blutreserven und Vorlaststeigerung^{1,3-5}
- Herzfrequenz bleibt weitgehend unverändert^{3,6}
- Milde Gefäßtonisierung^{3,4}

Beschriebener Wirkmechanismus der 3 Wirkkomponenten

Herzmuskelzellen

- **Adrenerge Wirkung:**
Positiv inotrope Wirkung durch β_1 -Rezeptor-Stimulation ^{1,2}
- **Hemmung der Phosphodiesterase 3 (PDE3):**
Positiv inotrope Wirkung wird verstärkt und verlängert ^{1,2}

AC, Adenylatzyklase; AR, Adrenorezeptor; ATP, Adenosin-Triphosphat; cAMP, zyklisches Adenosin-Monophosphat; G_s, G_s-Protein, NA, Noradrenalin; PDE3, Phosphodiesterase 3; 5'-AMP, Adenosin-5'-monophosphat

Modifiziert nach Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68

1. Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
2. Kloth et al., Front Pharmacol. 2017 May 23;8:272

Beschriebener Wirkmechanismus der 3 Wirkkomponenten

Glatte Gefäßmuskelzellen

- **α₁-adrenerge Wirkung:** Muskelkontraktion bzw. Vasokonstriktion ^{1,2}
- **Hemmung der Phosphodiesterase 3 (PDE3):** Muskelrelaxation bzw. Vasodilatation wirkt der NA-induzierten Vasokonstriktion entgegen ^{1,2}
- **Partiell agonistische Wirkung:** Verminderung der NA-induzierten Vasokonstriktion ^{1,2}

1. Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
 2. Kloth et al., Front Pharmacol. 2017 May 23;8:272

AC, Adenylatzyklase; AR, Adrenorezeptor; ATP, Adenosin-Triphosphat; cAMP, zyklisches Adenosin-Monophosphat; Gs, Gs-Protein, NA, Noradrenalin; PDE3, Phosphodiesterase 3; 5-AMP, Adenosin-5-monophosphat

Modifiziert nach Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68

Zusammenfassung

Der Blutdruckanstieg basiert auf einer funktionellen Interaktionen der Wirkkomponenten

1. Fachinformation Akrinor®, Stand: 8/19
2. Sternitzke N et al. Herz Kreislauf 1984;8:401-412
3. Bein B, et al.. Front Pharmacol. 2017 Feb 21;8:68
4. Weitzel M et al. Der Anaesthesist 2018;67:766-772
5. Heller et al., Anaesthesist. 2015 Mar;64(3):190-6
6. Hahn N, et al. Herz Kreislauf 1985;9:462-64. (präklinische Daten)
7. Schlepper M und Witzleb E. 1962; 12:841-843.(präklinische Daten)
8. Bihler K, et al. Anaesthesist 1972;21:428-436
9. Sakai K, et al. (Drug Res) 1972; 22(4):698-701 (präklinische Daten)
10. Sakai K, et al. Jap J Pharmac 1969;19:194-8 (präklinische Daten)

- Schneller Wirkeintritt durch Theodrenalin ^{1,2}
- Anhaltende Wirkung durch Cafedrin ^{1,2}
- **Balancierte Wirkung auf Herz und Gefäße** ¹⁻⁴
 - **Ökonomisierung der Herzarbeit**
 - Im Wesentlichen Volumenarbeit ¹⁻⁴
 - Milde Gefäßtonisierung: wirkt der anästhesiebedingten Vasodilatation entgegen ⁴
 - Herzfrequenz weitgehend unverändert ^{4,5}
 - Hinweis auf gute kardiale O₂-Bilanz ^{6,7}
 - **Günstig für Erhalt der Organdurchblutung**
 - Im Wesentlichen Volumenarbeit ¹⁻⁴
 - Hinweis auf gesteigerte Koronardurchblutung ^{6,7}
 - Günstig für die Nierenfunktion ⁸⁻¹⁰

Akrinor® 200 mg/2 ml + 10 mg/2 ml Injektionslösung

Wirkstoff: Cafedrin-HCl/Theodrenalin-HCl. **Zusammensetzung:** Jede Amp. mit 2 ml Injektionslg. enth.: 200 mg Cafedrinhydrochlorid, 10 mg Theodrenalinhydrochlorid. **Sonst. Bestandt.:** Natriummetabisulfit (Ph. Eur.) max. 0,4 mg (entspr. max. 0,27 mg SO₂), Ethanol 96 %, Glycerol 85 %, Natriumacetat-Trihydrat, Essigsäure 99 %, Wasser für Injektionszwecke. Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung), Essigsäure (zur pH-Wert-Einstellung). **Anwendungsgebiete:** Therapie anästhesiebedingter klinisch relevanter Blutdruckabfälle bei Erw., Therapie klinisch relevanter Hypotonien in der Notfallmedizin bei Erw. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gg. Cafedrinhydrochlorid, Theodrenalinhydrochlorid, Natriummetabisulfit od. einen d. sonst. Bestandt., Hypertonie, Mitralstenose, Engwinkelglaukom, Hyperthyreose, Phäochromozytom, Prostataadenom mit Restharnbildung, Bronchialasthmatiker mit Sulfitüberempfindlichkeit. **Warnhinw.:** AM enth. 12 Vol.-% Alkohol, Natriummetabisulfit (Ph. Eur.) max. 0,4 mg (entspr. max. 0,27 mg SO₂) u. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Ampulle. **Schwangerschaft/Stillzeit:** Akrinor darf nicht währ. der Schwangerschaft angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderl. Bei Anwendung in der Stillzeit ist Vorsicht geboten. **Nebenwirkungen:** Herzklopfen, bes. bei schweren Herzgefäßerkrank. sind pektanginöse Beschwerden bzw. deren Verstärkung u. ventrikuläre Rhythmusstör. mögl. Tachykardie u. Hypertonie. Bes. Hinw.: Natriummetabisulfit kann selten schwere Überempfindlichkeitsreakt. hervorrufen (insb. bei Bronchialasthmatikern), die sich als Erbrechen, Durchfall, Bronchospasmen, keuchende Atmung, akuter Asthmaanfall, Bewusstseinsstör. od. Schock äußern können. Verkehrshinweis! **Wechselwirkungen:** Beta-Blocker, DL-Norephedrin u. Ephedrin, Halothan. Währ. u. bis zu 2 Wo. nach Einn. v. MAO-Hemm. soll Akrinor nicht angew. werden. Natriumdisulfit ist eine sehr reakt.-fähige Verbindung. Es muss damit gerechnet werden, dass m. Akrinor zus. verabreichtes Thiamin (Vit. B1) abgebaut wird. **Dosierung:** Die i.v. Gabe sollte nach klinischer Wirkung fraktioniert erfolgen: z.B. nach Verdünnung mit NaCl 0,9% Lösung auf 10 ml in Einzelgaben von 1 ml dieser verdünnten Lösung. Max. TD beträgt 3 Amp. Injektionslösung kann i.m. und i.v. angewendet werden. **Status:** Verschreibungspflichtig. **Stand:** 8/19. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm